

# ANARSIA

## *(Anarsia lineatella)*

1. classificazione e ospiti
2. danni
3. ciclo biologico
4. lotta



# CLASSIFICAZIONE e OSPITI

## Classificazione

ordine  
famiglia

Lepidotteri  
Gelechidi

alimentazione

larve polifaghe

## Ospiti

principali  
occasionalmente

pesco, altre drupacee  
melo



## DANNI di ANARSIA

Su **pesco** attacca fiori, germogli, frutti


Sui **fiori**: **Inizio primavera**  
penetrano in coppa caliciana  
galleria alla base delle rosette fg e avvizzimento

Sui **germogli**: **Tarda primavera - estate**  
galleria midollare nei germogli  
avvizzimento degli stessi  
attenzione piante in vivaio (innesti ad occhio in autunno)

Sui **frutti**:  
in prossimità peduncolo galleria sottoepidermica  
penetrazione nella polpa



# CICLO BIOLOGICO (3 generazioni)



# LOTTA alla ANARSIA

Si raccomanda metodo **CONFUSIONE SESSUALE**

Solo se non è possibile



**INTERVENTI CHIMICI**

Bacillus thuringensis  
var. kurstaki

Prodotti chimici

CONFUSIONE SESSUALE

**EROGATORI**

- ☒ posizionarli prima 1° volo adulti
- ☒ da ultima decade aprile 2-3 per appezzamento
- ☒ intensificare in fasce perimetrali (att. venti dominanti)
- ☒ intensificare per grandi appezzamenti e poco uniformi

LOTTA CHIMICA

**SOGLIA**



IN ALTERNATIVA








**BOLLETTINI**

- ☒ 7 catture per trappola per settimana
- ☒ 10 cattura per trappola per due settimane
- ☒ contro larve 1<sup>a</sup> gen trattamento dopo 15 d
- ☒ per le altre gen dopo 6 d
- ☒ trattare su segnalazione di bollettini tecnici
- ☒ da monitoraggi interaziendali
- ☒ comprensori omogenei o di limitata dimensione

## LOTTA alla ANARSIA

## Prodotti chimici








## Chitino-inibitori

-  esaflumuron
-  lufenuron 
-  teflubenzuron
-  triflumuron


## Limitazioni d'uso

Max 3 per anno per coltura

## Fosfororganici

-  clorpirifos-etile 
-  clorpirifos metile 
-  fenitrotion 
-  malation

Max 6 fosfororganici per anno per coltura

 = max 2 anno<sup>-1</sup>

## Fenossiderivati

-  etofenprox 

END

## Danni su germogli di *Anarsia* (*Anarsia lineatella*)





Bozzolo sericeo di *Anarsia*  
(*Anarsia lineatella*)



Adulto di *Anarsia*  
(*Anarsia lineatella*)



## Adulto maschio di *Anarsia* (*Anarsia lineatella*)

